

Terbuthylazin-haltige Herbizid - Maßnahmen im Mais

Nur zulässig, wenn in den letzten 2 Jahren kein Terbuthylazin wie Successor, Spectrum Gold, Aspect eingesetzt wurde:

Standardverunkrautung:

- > Successor Top 3.0 (3,0 ltr. Successor T + 0,75 ltr. Border / ha)
- > Spectrum Gold (2,0 ltr. Spectrum Gold + 0,80 ltr. Mesotrioneprodukt / ha)
(Callisto, Barracuda, Border o.ä.)


Zugabe je ha bei Quecken von:
0,75 lt. Nico 40 oder ähnliches
(nur jedes zweite Jahr)
oder
1 lt. MaisTer power

Standardverunkrautung und Borstenhirse:

- > Laudis Aspect Pack (2,0 ltr. Laudis + 1,5 ltr. Aspect / ha)

Standardverunkrautung mit Borstenhirse und Quecke

- > MaisTer power Aspect Pack (1,25 ltr. MaisTer power + 1,25 ltr. Aspect / ha)



Aussaat Auflaufen 2-4 Blatt Stadium 6-8 Blatt Stadium Längenwachstum Rispenwachstum Blüte Fruchtentwicklung

Bei ausreichender Bodenfeuchtigkeit empfehlen wir eine frühe Anwendung (3-4 Blattstadium) mit verringerter Aufwandmenge und spätere Nachbehandlung bei Bedarf!

