

Bestandesdichte und Saatgutbedarf

Auszusäende Körner/m²

Getreideart	Körner/m ²	Körner/m ²
	Normale Aussaat	Späte Aussaat
Wintergerste	300-330	330-380
Winterroggen	200-250	250-270
Wintertriticale	280-320	320-360
Winterweizen	300-350	350-400
Sommergerste	280-320	360-400
Sommerhafer	320-360	320-360

Saatmenge in kg/ha =

angestrebte Pflanzen/m² x TKG
% Keimfähigkeit

Die hier getroffenen Aussagen beruhen auf Erfahrungen und Versuchsergebnissen. Jahresklima und Einzelstandort können Abweichungen mit sich bringen. Hierfür übernehmen wir keine Haftung.

Irrtum vorbehalten!

Kontakt

TIBA LANDHANDEL

Hauptsitz
Oorstr. 1
49844 Bawinkel
Tel: 05963-9419-0
Fax: 05963-9419-26

Filialen
Am Lasterbach 10
49740 Haselünne
Tel: 05961-365
Fax: 05961-7454

Bahnhofstraße 88
49757 Werlte
Tel: 05951-3302
Fax: 05951-3284

Am Geelen 2
49716 Meppen - Bokeloh
Tel: 05931-3018
Fax: 05931-3019

Homepage: www.tiba-krafftutter.de

E-mail: info@tiba-krafftutter.de

Landhandel & Kraftfutter



Empfehlung Pflanzenschutz Herbst 2022



TIBA Landhandel
Oorstr. 1
49844 Bawinkel
Tel: 05963-9419-0
Fax: 05963-941926

Homepage: www.tiba-krafftutter.de


Herbizidanwendungen im Getreide

Windhalmstandorte


Alle Getreidearten:

Nachauflauf:

allgemeine Mischverunkrautung



+ Kornblume, Kamille, Kerbel, Vogelmiere



BeFlex + Sunfire

(0,5 ltr./ha) + (0,2 - 0,3 ltr./ha in
WW,WG,WT; 0,15 ltr./ha in WR)

BeFlex + Carmina 640*

(0,5 ltr./ha) + (1,5 ltr./ha)

Carmina 640*

(2,5 ltr./ha)

Vor- u. Nachauflauf:

Mertil (0,4 ltr./ha)**

Den Bestand auf
Läuse kontrollieren.

Zusatz von
Mangan Blattdünger
bei ausreichender
Blattmasse

Die beste Wirkung der Herbizide wird erzielt, wenn so früh wie möglich im Nachauflauf behandelt wird!