

» DAT NEEISTE FÖR BUREN UN VEEH! «



TIBA
Kraftfutter

AUSGABE
März

Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt,

Schwimmflossen an, es geht direkt auf den Acker:

Getreide:

Allmählich sind die ersten Schläge nach den Niederschlägen wieder befahrbar, sodass die Andüngung endlich starten kann. Und das ist gut, denn es ist gerade in diesem Jahr wichtig, die Pflanze vor allem zur Bestockung und zum Schossen ausreichend mit Nährstoffen zu versorgen. In dieser Zeit finden die ertragsbildenden Prozesse statt. Zur Andüngung sollte auf ausreichende Mengen Nitrat-Stickstoff und Schwefel geachtet werden, damit vor allem schwache Bestände ausreichend Triebe bilden.

Dieses Jahr bieten wir wieder einen Stickstofffixierer an, der mit Pflanzenschutzmitteln ausgebracht werden kann und über die ganze Vegetation verteilt ca. 30 kg N/ha in die Pflanze holt → ohne in der Stickstoffbilanz aufzutauchen. Auch Blattdünger können die Bestände ordentlich aufpeppen.

Außerdem ist nun Zeit, die Bestände auf Unkräuter und Ungräser zu kontrollieren, so dass die Herbizidmaßnahme stattfinden sollte.

Grünland:

Die Temperatursumme von 200°C, bei der die Vegetation von Grünland beginnt, wurde im Emsland/Grafschaft Bentheim in der letzten Februarwoche erreicht. Zu diesem Zeitpunkt sollte das Gras ausreichend mit Nährstoffen versorgt sein. Also empfiehlt es sich auf jeden Fall, auch hier zu düngen, sobald die Flächen befahrbar sind. Die Düngung mit Kainit ist eine sehr gute Kombination für das Grünland und das Vieh, denn der hohe Natriumanteil sorgt für Schmackhaftigkeit und ist im Tierkörper ein essentieller Nährstoff, er verbessert die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Fruchtbarkeit. Außerdem bringt Kainit noch Kali, Magnesium und Schwefel mit.

Raps:

Wenn die Temperaturen über 10° C ansteigen können erste Schädlinge in den Raps einfliegen. Daher ist das Aufstellen der Gelbfangschalen auf den Standorten sehr wichtig.

Bei Temperaturen über 12°C sind die Gelbschalen regelmäßig zu kontrollieren. Bei mehr als 5 Stängelrüsslern bzw. 15 Kohltriebrüsslern innerhalb von 3 Tagen in den Schalen sollte reagiert werden! Die Gelbschalen sollten immer 10 cm über dem Rapsbestand stehen, also von weitem sichtbar sein. Die Bekämpfungsrichtwerte beinhalten einen gewissen Sicherheitszuschlag, so dass ein wirtschaftlicher Schaden unterhalb der Werte nicht zu befürchten ist.

Kartoffel:

Kartoffeln benötigen für ein optimales Wachstum einen lockeren und homogenen Boden. Ist dies gegeben, so wächst die Kartoffel nach dem Auflaufen bis zu 2 cm am Tag. Ideal sind 8°C Bodentemperatur, sie sollte möglichst nicht unter 5°C liegen. Lange Liegezeiten und wiederholte Nachtfröste verschlechtern die Konkurrenzkraft der Pflanzknollen. Zu frühe Kompromisse bei Bodenfeuchte und -struktur rächen sich bei Wachstum, Ertrag und Qualität. Wird die Knolle in zu nassen und kalten Boden gelegt, kann das Wachstum ober- wie unterirdisch zurückgehen. Die Folge daraus sind Bestände, die auch bei geringerer Stresssituation mit mangelndem oder gar fehlendem Zuwachs reagieren. → Bodenzustand geht vor Pflanztermin.

Frühjahrskalkung:

Eine ausreichende Kalkversorgung des Bodens ist für die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit bedeutend. Wichtig ist es, einen Blick auf die Bodenuntersuchungsergebnisse hinsichtlich des pH-Wertes zu richten. Auch wenn der pH-Wert im Optimalbereich liegt, muss regelmäßig gekalkt werden, um die unvermeidbaren Kalkverluste (z. B. Auswaschung, Eintrag versauernder Substanzen, Pflanzenentzug) zu ersetzen. Durch einen optimalen pH-Wert wird die biologische Aktivität des Bodens gefördert. Somit hat der pH-Wert einen Einfluss auf wichtige Abbau- und Umbauprozesse im Boden.

Bei uns erhalten Sie Kohlensäuren Kalk mit 85% Gesamtgehalt in Form von 80% CaCO₃ und 5% MgCO₃. Dieser ist langsam verfügbar und somit für den nachhaltigen Einsatz geeignet.

» DAT NEEISTE FÖR BUREN UN VEEH! «



TIBA
Kraftfutter

AUSGABE
März

Beachten Sie bitte auch unbedingt die beigefügte Erklärung zur EU-Verordnung 2019/1148 zur Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe. Wenn Sie Dünger von uns beziehen, benötigen wir diese (inkl. Ausweiskopie) - wie jedes Jahr - ausgefüllt und unterschrieben zurück. Bürokratie!!! ☹

Und wie immer zu Ostern unsere Aktion für das Osternest. Da kann man der oder dem Liebsten doch wunderhübsche Sachen schenken:

Zum Beispiel verkauft einer unserer Kunden 300 m3 Grassilage 3. Schnitt 2022 mit Analyse und 260 m3 Grassilage 4. Schnitt 2023. Hier kann auf Anfrage eine Analyse erstellt werden.

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 0173 – 614 12 15

Dann bietet ein Kunde zwei guterhaltene Husmann – Silos an, 12 to und 4 to. Bitte melden Sie sich dazu bei unserem Kollegen Norbert Strüwing, 0176 – 199 33 930.

Und dann der Hammer: Ein Mercedes Sprinter 316, Baujahr 2011, mit Pritsche. Da leuchten Männeraugen!!! Für dieses Prachtstück melden Sie sich bitte unter 05963 – 9419-0.

Ach ja, Ostern...

Informationen zu Ostern

**Karfreitag, den 29.03.2024 und Karsamstag, den 30.03.2024
liefern wir wie gewohnt Futter aus.
Ostermontag, den 01.04.2024 gönnen wir uns dann mal eine Pause.**

**Für alle Lieferungen, die bis Karsamstag geliefert werden sollen, bitten
wir Sie die Bestellungen bis Mittwoch, den 27.03.2024
bis 17 Uhr durchzugeben.**

**An Karsamstag sind wir dann wie gewohnt von
7.30 Uhr bis 12 Uhr telefonisch erreichbar.**

**Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir bei Bestellungen für Dienstag,
den 02.04.2024 nicht jedem Kunden eine Lieferung in der ersten Tour
garantieren können.**

Vielen Dank für Ihre Bemühungen und ein schönes Osterfest!

wünscht Ihnen Ihr TIBA - TEAM

☎ 05963 9419-0 • WWW.TIBA-KRAFTFUTTER.DE